

## UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

### CANIFUG 1 % otopina za kožu

*klotrimazol*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenivati lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi :**

1. Što je CANIFUG 1 % otopina za kožu i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati CANIFUG 1 % otopinu za kožu
3. Kako primjenjivati CANIFUG 1 % otopinu za kožu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati CANIFUG 1 % otopinu za kožu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. ŠTO JE CANIFUG 1 % OTOPINA ZA KOŽU I ZA ŠTO SE KORISTI**

Canifug 1 % otopina za kožu je antimikotik za vanjsku primjenu na koži.

Canifug 1 % otopina za kožu namijenjena je za liječenje gljivičnih infekcija kože uzrokovanih dermatofitima, kvascima (na primjer Candida vrste), plijesnima, i drugim gljivicama kao što je Malassezia furfur. Spomenute dermatomikoze mogu se pojaviti na nogama, koži i kožnim naborima, kao i Pityriasis versicolor, te površinske kandidijaze.

#### **2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI CANIFUG 1 % OTOPINU ZA KOŽU**

**Nemojte primjenjivati Canifug 1 % otopinu za kožu:**

- ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol, propilenglikol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- nemojte primjenjivati Canifug 1 % otopinu za kožu na dojke tijekom dojenja.

#### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Canifug 1 % otopinu za kožu.

#### **Djeca i adolescenti**

Nije potrebno prilagođavanje doze jer nema podataka o porastu učestalosti ili intenziteta nuspojava tijekom primjene Canifug 1 % otopine za kožu.

### **Drugi lijekovi i Canifug 1 % otopina za kožu**

Canifug 1 % otopina za kožu zahvaljujući aktivnoj tvari koju sadrži (klotrimazol), smanjuje djelotvornost amfotericina i ostalih polienskih antibiotika (nistatina, natamicina). Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

### **Canifug 1% otopina za kožu s hranom i pićem i alkoholom**

Nema poznatih interakcija.

### **Trudnoća, dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Ako Canifug 1 % otopinu za kožu primjenjujete onako kako je propisano u uputi o lijeku ili kako vam je preporučio liječnik, odnosno ljekarnik, pojava sustavnih učinaka (učinaka na druge organe) nije vjerojatna jer se klotrimazol ne apsorbira kroz neozlijeđeno ili upaljeno područje kože u krvotok. Usprkos tome njegova primjena u prva tri mjeseca trudnoće primjerena je samo ako tako preporučí liječnik. Još nisu provedena ispitivanja o primjeni Canifug 1 % otopine za kožu u trudnoći.

Dojilje ne smiju nanositi Canifug 1 % otopinu za kožu na dojke.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza.

### **Canifug1 % otopina za kožu sadrži propilenglikol**

Propilenglikol može uzrokovati nadražaj kože.

## **3. KAKO PRIMJENJIVATI CANIFUG 1 % OTOPINU ZA KOŽU**

Primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Canifug 1 % otopina primjenjuje se na kožu.

Ako nije drukčije propisano, Canifug 1 % otopina za kožu poprskajte na oboljelu kožu u tankom sloju 2 – 3 puta dnevno.

#### *Trajanje liječenja*

Redovita i dovoljno duga primjena važna je za uspjeh liječenja.

Duljina trajanja liječenja razlikuje se i ovisi o stupnju i lokalizaciji bolesti.

Kako bi se postiglo potpuno izlječenje, primjena lijeka ne smije biti prekinuta čim nestanu akutni simptomi upale ili subjektivni simptomi. Liječenje je potrebno nastaviti tijekom najmanje četiri tjedna.

Pityriasis versicolor obično se povlači unutar 1 – 3 tjedna. U slučaju atletske stopala liječenje je, unatoč brzom subjektivnom poboljšanju, potrebno nastaviti kroz dodatna dva tjedna nakon nestanka svih simptoma kako bi se spriječili recidivi.

Kod svake primjene Canifug 1 % otopine za kožu pridržavajte se dolje navedenih uputa:

- skinite prozirni poklopac sa sprej aplikatora.
- prije prvog korištenja lijeka nekoliko puta istisnite otopinu sve dok se ne postigne uravnoteženi mlaz. Pri sljedećoj primjeni sprej se može odmah upotrijebiti.
- otopinu prskajte po oboljelim dijelovima kože držeći bočicu na udaljenosti od 10 – do 30 cm od kože. Ovisno o mjestu primjene bočicu možete držati tako da je sprej aplikator okrenut prema gore ili prema dolje (vidi sliku).
- kod svake primjene sprej aplikator pritisnite jedanput ili dvaput. Ta je količina dovoljna i za gljivične infekcije većih površina kože.
- nanesenu otopinu utrljajte u kožu.
- vratite poklopac na sprej aplikator .
- kod gljivičnih infekcija stopala (atletsko stopalo) površinu između prstiju potrebno je nakon pranja pomno osušiti.

#### **Primjena u djece i adolescenata**

Nije potrebno prilagođavanje doze jer nema podataka o porastu učestalosti ili intenziteta nuspojava tijekom primjene Canifug 1 % otopine za kožu.

#### **Ako primijenite više Canifug 1 % otopine za kožu nego što ste trebali**

Nastavite liječenje s propisanom količinom lijeka.

#### **Ako ste zaboravili primijeniti Canifug 1 % otopinu za kožu**

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu nego nastavite liječenje prema propisanom doziranju.

#### **Ako prestanete primjenjivati Canifug 1 % otopinu za kožu**

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom kako ne biste doveli u pitanje uspjeh liječenja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Canifug 1 % otopine za kožu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### **4. MOGUĆE NUSPOJAVE**

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

#### **Važne nuspojave ili znakovi na koje morate obratiti pažnju i što učiniti ako se pojave kod Vas:**

Ako primijetite bilo koju od dolje navedenih nuspojava, prestanite primjenjivati Canifug 1 % otopinu za kožu te se čim prije obratite svom liječniku.

**Manje česte** nuspojave (kod 1 do 10 na 1000 bolesnika): nadražaj kože (npr. prolazno crvenilo, pečenje ili svrbež).

**Vrlo rijetke** nuspojave (manje od 1 na 10000 bolesnika): alergijske reakcije na klotrimazol, propilenglikol, makrogol 400 ili neki drugi sastojak Canifug 1 % otopine za kožu .

**Nije poznato** (učestalost nije moguće procijeniti na temelju raspoloživih podataka): u pojedinim slučajevima može doći do generalnih (općih) reakcija preosjetljivosti različitih stupnjeva težine. One mogu pogoditi: kožu (npr. svrbež, crvenilo), disanje (npr. ponestajanje daha), krvotok (npr. pad tlaka koji valja liječiti pa sve do poremećaja svijesti) te želučano-crijevni trakt (npr. mučnina, proljev).

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. KAKO ČUVATI CANIFUG 1 % OTOPINU ZA KOŽU**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25 °C. Staklenu bočicu čuvajte u kutiji, zaštićeno od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja spremnika: do isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE**

### **Što Canifug 1 % otopina za kožu sadrži:**

Djelatna tvar je klotrimazol.

1 ml otopine sadrži 0,01 g klotrimazola.

Drugi sastojci su: makrogol 400, izopropilni alkohol, propilenglikol.

### **Kako Canifug 1 % otopina za kožu izgleda i sadržaj pakiranja:**

Canifug 1 % otopina za kožu je bistra, bezbojna otopina u staklenoj bočici s pumpicom raspršivača.

30 ml otopine u bočici, u kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

REMEDIA d.o.o., Sv. Mateja 66, 10020 Zagreb

**Proizvođač lijeka**

Dr. AUGUST WOLFF GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld,  
Njemačka

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2015.**